

Entwicklung von Natur und Landschaft (ENL): Arten, Lebensraumtypen und Biotoptypen, der Stufe 1 (Fördersatz 100%) bzw. der Stufe 2 (Fördersatz 90%) der Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz im Freistaat Thüringen	
Stand: 13.07.2018	
	Stufe
Arten:	
Vogelarten der EG-Vogelschutzrichtlinie, Anhang I	1
Arten der FFH-Richtlinie, Anhang II und IV	1
Rote Liste 1 - Arten (Thüringen) bei folgenden Artengruppen (einschl. Rote Liste 0, soweit diese Arten in Thüringen wieder auftreten): Säugetiere Brutvögel Kriechtiere Lurche Fische und Rundmäuler Libellen Heuschrecken Tagfalter und Widderchen Farn- und Blütenpflanzen	1
Rote Liste 2 - Arten (Thüringen) bei folgenden Artengruppen: Säugetiere Brutvögel Kriechtiere Lurche Fische und Rundmäuler Libellen Heuschrecken Tagfalter und Widderchen Farn- und Blütenpflanzen	2
Arten, für die Thüringen eine besondere Verantwortung hat: a) Wirbeltiere Kreuzotter - <i>Vipera berus</i> Ringelnatter - <i>Natrix natrix</i> Fadenmolch - <i>Lissotriton helveticus</i> Feuersalamander - <i>Salamandra salamandra</i>	1
b) Wirbellose Bergbach-Blattkäfer - <i>Sclerophaedon orbicularis</i> Bluthals-Schnellkäfer - <i>Ischnodes sanguinicollis</i> <i>Brachyptera braueri</i> (Steinfliege) Breithals-Glankkäfer - <i>Ipidia binotata</i> Breitschulterbock - <i>Akimerus schaefferi</i> Buchenmulm-Zwergstutzkäfer - <i>Aeletes atomarius</i> Buquets Flachstirn-Tastkäfer - <i>Batrisodes buqueti</i> <i>Cassida pannonica</i> (Käfer) <i>Chloroperla susemicheli</i> (Steinfliege) <i>Chrysolina purpurascens</i> (Käfer) <i>Chrysolina rufa</i> (Käfer) <i>Drusus chrysotus</i> (Köcherfliege) <i>Ecdyonurus picteti</i> (Eintagsfliege) Edelkrebs - <i>Astacus astacus</i> Eichenbewohnender Breitfuß-Pilzfresser - <i>Cryptophagus quercinus</i>	1

	Stufe
b) Wirbellose (Fortsetzung) Elfenspornzikade - <i>Kelisia minima</i> Erlen-Prachtkäfer - <i>Dicerca alni</i> Eumerus longicornis (Schwebfliege) Felsflur-Zünlereule - <i>Zanclognatha zelleralis</i> Feuerschmied - <i>Elater ferrugineus</i> Fontainebleau-Schnellkäfer - <i>Ampedus brunnicornis</i> Gelbbeiniger Schwamm-Pflanzenkäfer - <i>Mycetochara flavipes</i> Gemeine Plumpschrecke - <i>Isophya kraussii</i> Glockenblumen-Graumönch - <i>Cucullia campanulae</i> Große Goldschrecke - <i>Chrysochraon dispar</i> Halesus rubricollis (Köcherfliege) Isoperla silesica (Steinfliege) Kardinalroter Schnellkäfer - <i>Ampedus cardinalis</i> Kleiner Heidegrashüpfer - <i>Stenobothrus stigmaticus</i> Kleiner Kugel-Stutzkäfer - <i>Abraeus parvulus</i> Kurzschröter - <i>Aesalus scarabaeoides</i> Kyffhäuserzikade - <i>Psammotettix inexpectatus</i> Langflügelige Schwertschrecke - <i>Conocephalus discolor</i> Leuctra alpina (Steinfliege) Longitarsus languidus (Käfer) Minota obesa (Käfer) Oreina alpestris (ssp. polymorpha) (Käfer) Pechbeiniger Stutzkäfer - <i>Teretrius fabrici</i> Perris Erdkäfer - <i>Trox perrisii</i> Platineule - <i>Apamea platinea</i> Plattrüssler - <i>Gasterocerus depressirostris</i> Psylliodes vindobonensis (Käfer) Reiters Strunk-Saftkäfer - <i>Synchita separanda</i> Reliktärer Lininen-Schwarzkäfer - <i>Corticeus bicoloroides</i> Rhizotrogus cicatricosus (Käfer) Rhön-Quellschnecke - <i>Bythinella compressa</i> Rotbindiger Linien-Schwarzkäfer - <i>Corticeus fasciatus</i> Rotflügeliger Halsbock - <i>Stictoleptura erythroptera</i> (= <i>Corymbia erythroptera</i>) Rötlicher Baummulm-Pöchkäfer - <i>Anitys rubens</i> Schwarzfleckiger Grashüpfer - <i>Stenobothrus nigromaculatus</i> Steppengraszirpe - <i>Praganus hofferi</i> Steppenwiesen-Blutströpfchen - <i>Zygaena angelicae</i> ssp. <i>Ratisbonensis</i> Triops cancriformis (Süßwasserkrebs) Verengter Schmalkopf-Augenhornhalbflügler - <i>Euryusa coarctata</i> Verstümmelter Laub-Schnellkäfer - <i>Crepidophorus mutilatus</i> Verworrener Breitfuß-Pilzfresser - <i>Cryptophagus confusus</i> Wantschaftschrecke - <i>Polysarcus denticauda</i> Weinrosen-Laubzikade - <i>Edwardsiana rhodophila</i> Zahnhalziger Baumschwamm-Schwarzkäfer - <i>Eledonoprius armatus</i> Zwergheideschnecke - <i>Trochoidea geyeri</i> Zwerggrashüpfer – <i>Stenobothrus crassipes</i>	1

	Stufe
c) Farn- und Blütenpflanzen Arnstädter Mehlbeere - <i>Sorbus subcordata</i> Böhmisches Sommerwurz - <i>Orobanche bohemica</i> Davall-Segge – <i>Carex davalliana</i> Eisenacher Mehlbeere - <i>Sorbus isenacensis</i> Felsen-Goldstern - <i>Gagea bohemica</i> Frühlings-Miere - <i>Minuartia verna</i> Glattes Brillenschötchen - <i>Biscutella laevigata</i> Graue Skabiose - <i>Scabiosa canescens</i> Graues Sonnenröschen - <i>Helianthemum canum</i> Krauses Greiskraut – <i>Tephrosieris crispa</i> Oellgaard-Flachbärlapp – <i>Diphasiastrum oellgaardii</i> Pfingst-Nelke - <i>Dianthus gratianopolitanus</i> Reichenbachs Segge - <i>Carex pseudobrizoides</i> Salztäschel - <i>Hymenolobus procumbens</i> Scheiden-Goldstern - <i>Gagea spathacea</i> Schmalblättriges Brillenschötchen - <i>Biscutella laevigata ssp. tenuifolia</i> Schwachgelappte Mehlbeere - <i>Sorbus parumlobata</i> Spatelblättriges Greiskraut - <i>Tephrosieris helenitis</i> Spitzwinkliger Mehlbeere - <i>Sorbus acutisecta</i> Stängelloser Tragant - <i>Astragalus exscapus</i> Täuschende Mehlbeere - <i>Sorbus decipiens</i> Vielkerbige Mehlbeere - <i>Sorbus multicrenata</i> Weicher Pippau - <i>Crepis mollis</i>	1
d) Moose <i>Acaulon casasianum</i> <i>Asterella saccata</i> <i>Cnestrum schisti</i> <i>Encalypta spathulata</i> <i>Fabronia pupilla</i> <i>Grimmia plagiopodia</i> <i>Pottia caespitosa</i> <i>Riccia trabutiana</i> <i>Tortula revolvens</i>	1
e) Süßwasser-Rotalgen <i>Lemanea rubra</i> (Bornemann) De Toni	1
f) Flechten <i>Acarospora placodiiformis</i> <i>Baeomyces callianthus</i> <i>Diploschistes diacapsis</i> <i>Rinodina terrestris</i>	1
g) Großpilze Braunflockiger Wulstling - <i>Amanita brunneoconulus</i> Gelber Schuppenwulstling - <i>Squamanita schreieri</i> Kleiner Röteltichterling - <i>Lepista abdita</i> Kleinster Erdstern - <i>Geastrum hungaricum</i> Kreisels Becherling - <i>Peziza kreiselii</i> Moosbecherling - <i>Octospora alpestris</i> Rotporiger Feuerschwamm - <i>Phellinus torulosus</i> Scheintintenpilz - <i>Montagnea radiosa</i>	1

Stelzenstäubling - <i>Battaraea phalloides</i> Steppenporling - <i>Polyporus rhizophilus</i> Walliser Lackporling - <i>Ganoderma valesiacum</i> Zierlicher Braunspor-Stacheling - <i>Sarcodon lepidus</i>	
--	--

	Stufe
Lebensraumtypen und Biototypen:	
FFH-Lebensraumtypen des Offenlandes (Wald-LRT nur in begründeten Ausnahmefällen)	1
Rote Liste 1 - Biototypen (Thüringen) des Offenlandes (Wald-Biototypen nur in begründeten Ausnahmefällen)	1
Rote Liste 2 - Biototypen (Thüringen) des Offenlandes (Wald-Biototypen nur in begründeten Ausnahmefällen)	2
Biototypen mit besonders großem Handlungsbedarf in Thüringen Altgewässer Standgewässer, natürlich artenreiche Kalkäcker	1